

# SALVANA Kälberstolz Brilliant Tejpótló borjútápszer

Teljes értékű tápszer borjak felneveléséhez

A borjak növekedését és fejlődését a takarmányozás illetve táplálásuk módja döntően befolyásolja. A borjak takarmányozásánál különösen figyelembe kell venni a fiatal állat emésztőrendszerének felépítését és működési sajátosságait.

A borjak bendőjének teljes kifejlődéséhez és működőképességének eléréséhez négy-öt hét szükséges, így ettől az életkortól kezdve lehet őket kérődző állatnak tekinteni.

A bendő kifejlődését a minél fiatalabb korban megkezdett szilárd takarmányok adagolása jelentősen elősegíti.

A borjak fejlődését és növekedési erélyüknek kihasználását a **SALVANA Kälberstolz Brilliant tejpótló borjútápszer** itatási technológiában javasolt adagolása valamint a korai abrak és széna etetése biztosítja.

## Beltartalom:

Nyers fehérje	19,00 %	A vitamin	25.000 NE/kg
Nyers zsír	16,00 %	D3 vitamin	4.000 NE/kg
Nyers rost	0,30 %	E vitamin	160 mg/kg
Nyers hamu	8,00 %	Cink	70 mg/kg
Lizin	1,70 %	Réz	8 mg/kg
Kalcium	0,90 %	Vas	100 mg/kg
Foszfor	0,80 %	Mangán	55 mg/kg
Nátrium	0,60 %		
Endosan 2,0x 10 <sup>9</sup> TFE Lactobacillus rhamnosus és Enterococcus faecium			

**Összetétel:** Tejsavópor, sovány tejpópor(30%), növényi zsírok ( pálmazsír, kókuszszsír, savó fehérje koncentrátum,

## Felhasználási javaslat

A borjakat naponta 2 alkalommal itatjuk (100-125 g tejpótlót oldunk fel 1 liter vízben)

Életkor Hetekben	Koncentrátum g/liter/víz	Tejpótló g/nap	Adagolás liter/nap	Kälbermüsli g/nap
1	csak föccstej/teljes tej	750-1050	5-7	szoktatásként
2	150g/liter	900-1200	6-8	50
3	150g/liter	900-1200	6-8	150
4	150g/liter	900-1200	6-8	300
5	150g/liter	625-875	5-7	600
6	125g/liter	500-750	4-6	750
7	125g/liter	250-500	2-4	875
8	125g/liter			max 2 kg
9-10	tej itatást csökkenteni/leválasztani			

A kimért tejpor mennyiséget 45 C° hőmérsékletű vízben kell feloldani és azonnal itatni, itatási hőmérséklet 38-40 C° .

Az itatási időszak vége felé a csökkentett napi mennyiséget egy alkalommal is itathatjuk. Temperált tiszta ivóvíz állandóan legyen az állatok előtt.

Amennyiben a borjaknál bármiféle rendellenesség lépne fel ( fénytelen felálló szőrzet, étvágytalanság, hasmenés) javasoljuk a **SALVANA Immun Plus** immunerősítő por adagolását a tejpótló borjútápszerhez.

Jelentősebb hasmenés esetén célszerű 2-4 alkalommal az itatást nem tejpótlóval hanem **SALVANA SICCO STOP** elektrolit oldat itatásával helyettesíteni.

**Termékszám:** 1266  
**Szavatosság:** gyártástól számított min. 9 hónap  
**Kiszerezés:** 25 kg zsák